

La tasa de mortalidad de las colonias de abejas bajó entre 2012 y 2014 según un estudio de la CE

Noticias

Son datos que se desprenden del estudio "Epilobee" que comenzó en 2012 para obtener una información detallada sobre los índices de mortalidad de las abejas

Un estudio elaborado por la Comisión Europea (CE) ha revelado que la tasa de mortalidad de las colonias de abejas ha descendido en el territorio comunitario de 2012 a 2014.

Son datos que se desprenden del estudio "Epilobee" que comenzó en 2012 para obtener una información detallada sobre los índices de mortalidad de estas colonias en la UE y profundizar en el conocimiento de los factores que afectan a la salud de las abejas. El informe detalla que se han observado diferencias regionales "significativas" en las pérdidas de abejas, siendo el clima uno de los principales factores que ha influido en la mortalidad de las colonias de invierno.

No obstante, "Epilobee" matiza que al clima hay que unir "otros factores de riesgo" que "sin duda" han contribuido a la mortalidad. A pesar de la bajada de los índices de mortalidad en estos dos últimos años, el estudio indica que este período de observación "no es suficiente" para determinar si esta tendencia continuará.

Por ello, ve necesario una observación a "largo plazo" para obtener un "panorama representativo" de la mortalidad de las colonias de abejas en Europa.

Redacción