

Los focos de encefalopatía espongiforme bovina cayeron un 28% en 2009

Noticias

En 2009 se han realizado 468.168 test de vigilancia, mientras que el acumulado desde 2001 hasta 2009 asciende a 4.699.367 test.

El número de focos de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) cayó en España un 28 por ciento en 2009, hasta 18 casos, mientras que la prevalencia de brucelosis bovina en los rebaños fue del 0,32 por ciento frente al 0,40 por ciento del ejercicio anterior.

Según un informe de la Subdirección General de Sanidad de la Producción Primaria del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), en 2009 se han realizado 468.168 test de vigilancia de la EEB, mientras que el acumulado desde 2001 hasta 2009 asciende a 4.699.367 test.

El informe recoge que, desde el año 2000, el mayor número de focos se registró en 2003, con 167, ejercicio a partir del cual ha descendido de manera continuada el número de casos.

Del total de focos registrado en 2009, los datos reflejan que en 4 de los casos el año de nacimiento de la res fue el 2000; en 3 casos, a 1999; en otros 3, a 1998; en 2, a 1997; y en otros 2, a 1993.

En el resto de los casos detectados (4) los animales nacieron en los años 1989, 1990, 1994 y 1995, respectivamente.

En cuanto a la brucelosis bovina, destaca que la incidencia de esta enfermedad en animales fue del 0,07 por ciento en 2009 frente al 0,09 de un año antes

Por Comunidades Autónomas, la prevalencia de esta zoonosis en los rebaños fue del 1,27 por ciento en Castilla y León, seguida de Madrid (1,21 por ciento), Extremadura (0,67 por ciento), Cantabria (0,60 por ciento), Castilla-La Mancha (0,48 por ciento), Cataluña (0,44 por ciento), Andalucía (0,27 por ciento), Navarra (0,12 por ciento), Galicia (0,04 por ciento) y País Vasco (0,02 por ciento).

Por su parte, presentan prevalencia cero la Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia, La Rioja, Canarias, Baleares y Asturias.

Si se consideran los indicadores por aptitud productiva, en el bovino de aptitud cárnica la prevalencia en el rebaño es del 0,38 por ciento (frente al 0,44 por ciento en 2008) y la incidencia en animales, del 0,25 por ciento (0,32 por ciento en 2008).

Por lo que se refiere a la tuberculosis bovina, la prevalencia en los rebaños fue del 1,65 por ciento, frente al 1,59 por ciento del ejercicio anterior, mientras que la incidencia en animales fue del 0,41 por ciento (0,48 por ciento en 2008).

Por Comunidades Autónomas, la prevalencia de esta enfermedad en los rebaños fue del 10,27 por ciento en Castilla-La Mancha (10,27 por ciento), seguida de Andalucía (8,94 por ciento), Madrid (5,54 por ciento), Extremadura (3,78 por ciento), Murcia (3,51 por ciento), Castilla y León (2,75 por ciento), Comunidad Valenciana (1,38 por ciento) y Cantabria (0,91 por ciento).

A éstas le siguen Cataluña (0,83 por ciento), La Rioja (0,75 por ciento), Aragón (0,70 por ciento), País Vasco (0,57 por ciento), Navarra (0,30 por ciento), Galicia (0,22 por ciento) y Asturias (0,21 por ciento).

En este caso, presentan prevalencia cero Baleares y Canarias.

Respecto a los indicadores por aptitud productiva, en el bovino de aptitud cárnica la prevalencia de rebaño es del 1,82 por ciento (frente al 1,75 por ciento en 2008) y la incidencia en animales del 1,12 por ciento (0,96 por ciento en 2008).

En el bovino lechero la prevalencia de rebaño es del 0,62 por ciento (0,65 por ciento en 2008) y en animales fue del 0,46 por ciento (0,44 por ciento).

Redacción